

Mid Trimester Medical Abortion

13 – 17 + 6 Weeks

Risks And Complications

Immediate complications

- Incomplete abortion
Retained products/products requiring surgical intervention 90 in 1000 (9%)
- Bleeding
About 6 in 1000 (0.6%) will require a blood transfusion
- Continuing pregnancy - fetus not expelled after repeated drug regimens 8 in 1000 (0.8%)
- Uterine rupture – 2 in 100,000 cases
- Infection 5 in 100 (5%)

Delayed complications

In the Early Weeks

- a) Uterine/pelvic infection – less than 5 in 100
- b) Short term emotional distress

Long Term

a) Future reproductive outcome

No proven association between abortion and infertility or ectopic pregnancy. However, it may be associated with a small increase risk of subsequent miscarriage or preterm delivery.

b) Psychological sequelae

These are rare. Some studies suggest a small increase risk of suicide, attempted suicide or self harm after abortion. These may reflect the pre-existing condition.

Breast Cancer Risk

There is no association between induced abortion and breast cancer.

If you have any comments about this leaflet or the service you have received you can contact :

Gynae Assessment Unit
Calderdale Royal Hospital

Telephone No: 01422 224979 / 224415 / 224416

www.cht.nhs.uk

If you would like this information in another format or language contact the above.

Potřebujete-li tyto informace v jiném formátu nebo jazyce, obraťte se prosím na výše uvedené oddělení

Jeżeli są Państwo zainteresowani otrzymaniem tych informacji w innym formacie lub wersji językowej, prosimy skontaktować się z nami, korzystając z ww. danych kontaktowych

ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਚੂਪ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ,
ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

اگر آپ کو یہ معلومات کسی اور فارمیٹ طرزبان میں درکار ہوں، تو
برائے مہربانی مندرجہ بالا شعبے میں ہم سے رابطہ کریں۔

"إذا احتجت الحصول على هذه المعلومة بشكل مغاير أو مترجمة إلى لغة مختلفة فيرجى منك الاتصال بالقسم
المذكور أعلاه"