

Medical Abortion Between (10 - 13 weeks of pregnancy)

Risks and Complications

(Estimates given are based on several studies in the world literature)

Immediate Complications

- Bleeding – 5 in 1000 (0.5%) will require blood transfusion
- Infection – 50 in 1000 (5%)
- Incomplete abortion - retained products of conception requiring surgical intervention – 50 in 1000 (5%)
- Continuing pregnancy (failed abortion) – 7 in 1000 (0.7%)

Delayed Complications

Early Weeks

- a) Short term emotional distress
- b) Uterine/pelvic infection – less than 5 in 100

Long term

a) Future reproductive outcome

There is no proven association between abortion and ectopic pregnancy or infertility. However it may be associated with a small increase risk of subsequent miscarriage or preterm delivery.

b) Psychological sequelae

These are rare. Some studies suggest a small increase risk of suicide or attempted suicide or self harm after abortion. These may reflect the pre-existing conditions.

Breast Cancer Risk

There is no association between induced abortion and breast cancer.

If you have any comments about this leaflet or the service you have received you can contact :

Gynae Assessment Unit
Calderdale Royal Hospital
Telephone No: 01422 224979 / 224415 / 224416

www.cht.nhs.uk

If you would like this information in another format or language contact the above.

Potřebujete-li tyto informace v jiném formátu nebo jazyce, obraťte se prosím na výše uvedené oddělení

Jeżeli są Państwo zainteresowani otrzymaniem tych informacji w innym formacie lub wersji językowej, prosimy skontaktować się z nami, korzystając z ww. danych kontaktowych

ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਚੂਪ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ,
ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

اگر آپ کو یہ معلومات کسی اور فارمیٹ کی زبان میں درکار ہوں، تو
برائے مہربانی مندرجہ بالا شعبے میں ہم سے رابطہ کریں۔

"إذا احتجت الحصول على هذه المعلومة بشكل مغاير أو مترجمة إلى لغة مختلفة فيرجى منك الاتصال بالقسم
المذكور أعلاه"